

**Am 03.06.2010 finden keine Tutorien statt (Fronleichnam).**

**Aufgabe 1: Linienintegral.** Betrachtet werden Linienintegrale entlang der Parabel  $y = 2x^2$  in der Ebene  $z = 0$ , zwischen den Punkten  $P_1 = (0, 0, 0)$  und  $P_2 = (1, 2, 0)$  (bitte skizzieren!). Ein Kraftfeld  $\vec{F} := 3xy \vec{e}_x - y^2 \vec{e}_y$  sei vorhanden.

- (a) Bestimmen Sie die Bogenlänge der Parabel zwischen  $P_1$  und  $P_2$  (2 Punkte).  
 [Hinweis:  $\int^x dy \sqrt{1 + c^2 y^2} = \frac{x}{2} \sqrt{1 + c^2 x^2} + \frac{1}{2c} \operatorname{arsinh}(cx)$ .]
- (b) Ermitteln Sie die „Arbeit“  $W := \int_C d\vec{r} \cdot \vec{F}$  (2 Punkte).
- (c) Sei letztendlich  $\vec{F} = \frac{mgR^2 \vec{r}}{r^3}$ , wobei  $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$  und  $R \approx 6400 \text{ km}$ . Ein Körper mit Masse  $m = 1 \text{ kg}$  wird vom  $r = R$  nach  $r = \infty$  geschossen. Ermitteln Sie die Arbeit  $W$  in diesem Fall (2 Punkte). [Hinweis: Sie können  $C$  frei wählen.]

**Aufgabe 2: Ein konservatives Kraftfeld.** Ein Vektorfeld  $\vec{F}$  wird „konservativ“ genannt, falls es der Form  $\vec{F} = \nabla\phi$  ist. In diesem Fall ist das Linienintegral  $W := \int_C d\vec{r} \cdot \vec{F}$  unabhängig vom Integrationsweg. Sei jetzt  $\vec{F} := x \vec{e}_x + y \vec{e}_y$ ,  $P_a := (0, 0, 0)$ ,  $P_b := (1, 1, 0)$ .

- (a) Berechnen Sie  $W$  entlang der Geraden zwischen  $P_a$  und  $P_b$  (2 Punkte).
- (b) Ein anderer Integrationsweg bestehe aus zwei Teilen, zuerst aus einer Geraden zwischen  $P_a$  und  $P_c := (1, 0, 0)$ , dann aus einer Geraden zwischen  $P_c$  und  $P_b$  (bitte skizzieren!). Bestimmen Sie den Wert von  $W$  entlang dieser Kurve (2 Punkte).
- (c) Ermitteln Sie letztendlich eine Funktion  $\phi$  mit der Eigenschaft  $\vec{F} = \nabla\phi$ , und verifizieren Sie die Gültigkeit der Beziehung  $W = \phi(P_b) - \phi(P_a)$  (2 Punkte).

**Aufgabe 3: Flächenintegral.** Betrachtet wird ein Quadrant einer Ellipse,  $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$  (bitte skizzieren!). Der Quadrant wird durch die Koordinaten  $\rho \in (0, 1]$ ,  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$  parametrisiert, mit  $x = a \rho \cos \varphi$ ,  $y = b \rho \sin \varphi$ .

- (a) Bestimmen Sie die Fläche des Quadrants,  $A := \int_S dA$  (2 Punkte). [Antwort:  $A = \frac{\pi ab}{4}$ .]

- (b) Die „Schwerpunktkoordinaten“  $x_0, y_0$  werden durch

$$x_0 := \frac{1}{A} \int_S dA x, \quad y_0 := \frac{1}{A} \int_S dA y$$

definiert. Bestimmen Sie diese (2 Punkte). [Antwort:  $x_0 = \frac{4a}{3\pi}$ ,  $y_0 = \frac{4b}{3\pi}$ .]

- (c) Ermitteln Sie ebenfalls die „Trägheitsmomente“ (2 Punkte)

$$J_x := \int_S dA (x - x_0)^2, \quad J_y := \int_S dA (y - y_0)^2.$$

**Aufgabe 4: Volumenintegral.** Bestimmen Sie

$$I = \int_V dx dy dz \frac{1}{(x + y + z + 1)^3},$$

wenn  $V$  das von den Ebenen  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $x + y + z = 1$  eingeschlossene Tetraeder ist (bitte skizzieren!) (6 Punkte). [Antwort:  $I = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}$ .]