

4.4. Diskrete Symmetrien: C, P, T

Was ist eine Symmetrie? Das hängt vom Formalismus ab.

(i) klassische Feldtheorie:

Seite 4; 54  $\Rightarrow$

$$\Delta S_M = \int_{\Delta} d^4x \mathcal{L}_M \text{ bleibt invariant in } \begin{cases} \Psi(x) \rightarrow \Psi'(x') \equiv S\Psi(x) \\ \bar{\Psi}(x) \rightarrow \bar{\Psi}'(x') \equiv \bar{\Psi}(x)S^{-1} \\ x \rightarrow x' \end{cases}$$

(ii) nach "kanonischer" Quantisierung:

Es gibt eine Transformation  $\hat{T}$ , die unitär ( $\langle \hat{T}\phi | \hat{T}\chi \rangle = \langle \phi | \chi \rangle$ ) bzw. antiunitär ( $\langle \hat{T}\phi | \hat{T}\chi \rangle = \langle \chi | \phi \rangle$ ) ist, und den Hamilton-Operator invariant läßt:

$$:\hat{H}: = \int d^3\vec{x} : \hat{\Psi} [-i\gamma^i \partial_i + m] \hat{\Psi} : ; \quad \underline{\underline{\hat{T} : \hat{H} : \hat{T}^\dagger = : \hat{H} :}}$$

Die Feld-Operatoren sind nicht invariant, aber transformieren "untereinander":

$$\hat{T} \hat{\Psi}(x) \hat{T}^\dagger \equiv \eta^T \hat{\Psi}(x') \text{ bzw. } \eta^T \hat{\Psi}^*(x')$$

$\uparrow$   
 Dirac-Matrix oder  $\mathbb{1}_{4 \times 4}$   
 $\leftarrow$  komplexer Phasenfaktor

$$\langle \vec{q}, t | \hat{S} | \vec{p}', s' \rangle = \langle \vec{q}, t | \hat{T}^\dagger \hat{S} \hat{T} | \vec{p}', s' \rangle$$

Als Operatoren sind  $\hat{\Psi}$  und  $\hat{\bar{\Psi}} \equiv \hat{\Psi}^\dagger \gamma_0$  nicht unabhängig.

$\leftarrow$  Teichenzustände transformieren auch,  $|\vec{p}, s\rangle \rightarrow \hat{T} |\vec{p}, s\rangle = |\vec{p}, s\rangle$ .

(iii) nach Pfadintegralquantisierung:

$\int \mathcal{D}\bar{\Psi} \mathcal{D}\Psi \exp(-S_E)$  bleibt invariant nach einer

Substitution der Integrationsvariablen:

$$\Psi(x) \rightarrow \eta^T \Psi(x') \text{ bzw. } \eta^T \Psi^*(x')$$

Die Felder  $\Psi(x)$  und  $\bar{\Psi}(x)$  sind unabhängige Integrationsvariablen.

# Was für Symmetrien gibt es?

(a) kontinuierliche "innere" Symmetrien, z.B.

$$\hat{T} \hat{\Psi}(x) \hat{T}^\dagger \equiv e^{i\alpha} \hat{\Psi}(x) \quad \text{bzw.} \quad \begin{cases} \Psi(x) \rightarrow e^{i\alpha} \Psi(x) \\ \bar{\Psi}(x) \rightarrow \bar{\Psi}(x) e^{-i\alpha} \end{cases}$$

Wir kehren später zu diesem Fall zurück.

(b) eigentliche orthochrone Lorentz-Transformationen  $L^\uparrow$

Diese wurden schon berücksichtigt.

(c) in Minkowski-Raumzeit [mit kanonischer Quantisierung]:

(i) Raumspiegelung :  $\Lambda_P = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \in L_-$

(ii) Zeitumkehr :  $\Lambda_T = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \in L^\downarrow$

(iii) hermitesche Konjugierung :  $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$

(iv) Ladungskonjugation :  $\hat{C} \hat{\Psi}(x) \hat{C}^\dagger = \eta \cdot C \cdot \hat{\Psi}^*(x)$

Nur drei davon sind unabhängig: wir verlangen (iii), und nehmen (i), (iv) als nicht-triviale Symmetrien. Wie das CPT-Theorem sagt, ist (ii) dann nicht mehr unabhängig, sondern durch (i), (iv) so gegeben, daß CPT eine Symmetrie ist.

(d) in euklidischer Raumzeit [mit Pfadintegralformalismus]:

Die volle Lorentz-Symmetrie ist hier  $O(4)$  statt  $O(3,1)$ . Die entsprechende Mannigfaltigkeit hat nur zwei disjunkte Teile, mit  $\det \Lambda = \pm 1$ . Das heißt, (i) und (ii) sind nicht mehr unabhängig!

Also bleiben wieder drei nicht-triviale Symmetrien zu verifizieren: (i), (iv), und ein Analogon zu (iii).

Im Folgenden betrachten wir genauer den Fall (d).

$$S_E = \int d^4x \bar{\Psi}(x) [\gamma^\mu \partial_\mu + m] \Psi(x)$$

Raumspiegelung bzw. Parität P

$$\partial_i^{\vec{x}} \Psi(x^0, -\vec{x}) = -\partial_i^{\vec{x}'} \Psi(x^0, -\vec{x}')$$

⇒  $S_E$  ist invariant (Notabene:  $\int d^3\vec{x} = \int d^3[-\vec{x}]$ ), falls wir eine Dirac-Matrix  $P$  finden, mit der Eigenschaft

$$P^{-1} \gamma_\mu P = \begin{cases} \gamma_\mu, & \mu=0 \\ -\gamma_\mu, & \mu \neq 0 \end{cases}$$

und die Substitutionen

$$\begin{aligned} \Psi(x^0, \vec{x}) &\rightarrow \eta_P P \Psi(x^0, -\vec{x}) \\ \bar{\Psi}(x^0, \vec{x}) &\rightarrow \bar{\Psi}(x^0, -\vec{x}) \eta_P^* P^{-1} \end{aligned}$$

mit  $|\eta_P|^2 = 1$ , durchführen.

Weil die Matrizen  $\tilde{\gamma}_\mu \equiv \{\gamma_0, -\gamma_1, -\gamma_2, -\gamma_3\}$  die Algebra  $\{\tilde{\gamma}_\mu, \tilde{\gamma}_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$  erfüllen, dürfte eine solche "Ähnlichkeitstransformation" immer existieren. Und in der Tat:  $P \equiv \gamma_0$  funktioniert!

Ladungskonjugation C

Versuchen wir einen "Umtausch"  $\Psi \leftrightarrow \bar{\Psi}$ , oder genauer, mit Komponenten:

$$\begin{aligned} \Psi_\alpha &\rightarrow \bar{\Psi}_\beta C_{\beta\alpha}^{-1} \cdot \eta_C \\ \bar{\Psi}_\alpha &\rightarrow -C_{\alpha\beta} \Psi_\beta \cdot \eta_C^* \end{aligned}$$

Falls  $|\eta_C|^2 = 1$ , bekommen wir damit

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_E &\rightarrow -C_{\alpha\beta} \Psi_\beta \left\{ [\gamma^\mu]_{\alpha\beta} \vec{\partial}_\mu + m \delta_{\alpha\beta} \right\} \bar{\Psi}_\beta C_{\beta\alpha}^{-1} \\ &= + \bar{\Psi}_\beta C_{\beta\alpha}^{-1} \left\{ [\gamma^\mu]_{\beta\alpha} \vec{\partial}_\mu + m \delta_{\beta\alpha} \right\} C_{\alpha\beta} \Psi_\beta \end{aligned}$$

Nach einer partiellen Integration ist also

$$S_E \rightarrow \int d^4x \bar{\Psi}(x) \left\{ -C^{-1} \gamma_\mu^T C \vec{\partial}_\mu + m \right\} \Psi(x)$$

Kann man eine Matrix mit der Eigenschaft

$$C^{-1} \gamma_\mu^T C = -\gamma_\mu \iff C \gamma_\mu C^{-1} = -\gamma_\mu^T$$

finden? Weil die Matrizen  $\hat{\gamma}_\mu \equiv \{-\gamma_\mu^T\}$  die Algebra  $\{\hat{\gamma}_\mu, \hat{\gamma}_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$  erfüllen, sollte das wieder der Fall sein. Und in der Tat:

Ein Beispiel wird in Aufgabe 9.3 gegeben.

# Hermitizität

Normalerweise  $(AB)^{\dagger} = B^{\dagger} A^{\dagger}$ , aber was man mit Grassmann-Variablen tut, ist einigermaßen eine Definitionsfrage. Das Wesentliche ist, was mit dem Dirac-Operator ( $D_M \equiv i\gamma^{\mu} \partial_{\mu} - m$ ;  $D_E \equiv \gamma^{\mu} \partial_{\mu} + m$ ) passiert.

Ohne Minuszeichen, in Minkowski-Raumzeit:

$$\begin{aligned} \left[ \hat{\Psi}^{\dagger} \gamma^0 (+i\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} - m) \hat{\Psi} \right]^{\dagger} &= \hat{\Psi}^{\dagger} (-i\gamma^{\mu \dagger} \vec{\partial}_{\mu} - m) \gamma^0 \hat{\Psi} && ; \gamma^0 \gamma^{\mu \dagger} \gamma^0 = \gamma^{\mu} ; \gamma^{0\dagger} = \gamma^0 ; \\ & && \gamma^0 \gamma^0 = \mathbb{1} \\ &\stackrel{\text{"partielle Integration"}}{=} \hat{\Psi}^{\dagger} \gamma^0 (+i\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} - m) \hat{\Psi} \end{aligned}$$

Also mit dieser Konvention scheint  $\hat{H}$  hermitesch zu sein — auf jeden Fall ist  $D_M$  ein hermitescher Differentialoperator.

Im euklidischen Fall scheint dasselbe nicht mehr zu funktionieren:

$$\begin{aligned} * \quad \left[ \bar{\Psi} (\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m) \Psi \right]^{\dagger} &\stackrel{?}{=} \left[ \Psi^{\dagger} \gamma_0 (\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m) \Psi \right]^{\dagger} = \Psi^{\dagger} (\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m) \gamma_0 \Psi && ; \gamma_0^{\dagger} = \gamma_0 \\ &= \Psi^{\dagger} (-\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m) \gamma_0 \Psi = \Psi^{\dagger} \gamma_0 (-\gamma_0 \gamma_0 + \gamma_0 i + m) \Psi \quad \hat{?} \\ * \quad (\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m)^{\dagger} &\stackrel{?}{=} \gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m = -\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m \quad \hat{?} \end{aligned}$$

Aber die Eigenschaft selbst muß immer noch irgendwo verborgen sein!

Angemessene Verfahren:

(a) für den Dirac-Operator:  $\gamma_5$ -Hermitizität.

$$\gamma_5 (\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m)^{\dagger} \gamma_5 = \gamma_5 (-\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m) \gamma_5 = \gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m.$$

(b) für die Wirkung:  
Komplexkonjugierung zusammen mit den Substitutionen

$$\begin{aligned} \Psi_{\alpha} &\rightarrow \bar{\Psi}_{\beta} [\gamma_5]_{\beta\alpha} \\ \bar{\Psi}_{\alpha} &\rightarrow -[\gamma_5]_{\alpha\beta} \Psi_{\beta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_E &\rightarrow \int d\tau d^3\vec{x} \left\{ -[\gamma_5]_{\alpha\beta} \Psi_{\beta} \left( [\gamma_5^{\dagger}]_{\alpha\delta} \vec{\partial}_{\mu} + m^* \delta_{\alpha\delta} \right) \bar{\Psi}_{\xi} [\gamma_5]_{\xi\delta} \right\} \\ &= \int d\tau d^3\vec{x} \left\{ \bar{\Psi}_{\xi} [\gamma_5]_{\xi\delta} \left( [\gamma_5^{\dagger}]_{\delta\alpha} \vec{\partial}_{\mu} + m^* \delta_{\delta\alpha} \right) [\gamma_5]_{\alpha\beta} \Psi_{\beta} \right\} \\ &= \int d\tau d^3\vec{x} \left\{ \bar{\Psi} \gamma_5 (-\gamma^{\mu} \vec{\partial}_{\mu} + m^*) \gamma_5 \Psi \right\} = S_E, \quad \text{falls } m^* = m. \end{aligned}$$